



Chlorhexidine Gluconate (CHG) 4% Solution


FDA-Approved Instructions for Patient Preoperative Skin Preparation



For more information, contact
your Clorox representative at
1-800-760-3236 or email
[AplicareCustomerService@
clorox.com](mailto:AplicareCustomerService@clorox.com).



1. APPLY product
liberally to surgical
site and swab for at
least 2 minutes.



2. DRY with a sterile towel.

3. REPEAT steps 1 and 2.

Warnings:

For external use only. Do not use:

- If you are allergic to chlorhexidine gluconate or any other ingredients
- In contact with meninges
- In the genital area
- As a preoperative skin preparation of the head or face

See product label for complete drug facts.



Solución de Gluconato de Clorhexidina (CHG) al 4%


Instrucciones para la Preparación Cutánea Preoperatoria del Paciente Aprobadas por la FDA



Para obtener más información, comuníquese con su representante de Clorox al **1-800-760-3236** o envíe un correo electrónico a AplicareCustomerService@clorox.com.



1. APLIQUE abundante producto al sitio de la cirugía y limpie por lo menos durante 2 minutos.



2. SEQUE con una toalla estéril.

3. REPITA los pasos 1 y 2.

Advertencias:

Solamente para uso externo. No lo use:

- Si es alérgico al gluconato de clorhexidina o a cualquier otro ingrediente
- En contacto con las meninges
- En los órganos genitales
- Como preparación cutánea preoperatoria de la cabeza o la cara

Consulte la etiqueta del producto donde aparece la información completa sobre el medicamento.